

Неделя 6. Мартингалы

Carlos Buitrago

Table of contents

1	Определение мартингала	1
1.1	2.1. Критерий для процессов с независимыми приращениями	2
1.2	2.2. Примеры	2
1.3	Эксперимент 1. Справедливая игра, дрейф и пуассоновская компенсация	3
2	3. Выпуклые функции и субмартингалы	3
3	4. Разложение Дуба (дискретное время)	4
3.1	4.1. Дополнение: пример с зависящим от прошлого дрейфом	5
4	5. Марковские моменты и остановленные процессы	5
5	6. Теорема об остановке (дискретное время)	6
5.1	6.1. Следствие из конспекта и полезные дополнения	6
5.2	Эксперимент 2. Неограниченная остановка: где ломается интуиция	7
6	7. Задача о разорении игрока	7
6.1	7.1. Честная игра: $p = q = 1/2$	7
6.2	7.2. Нечестная игра: $p \neq q$	8
6.3	Эксперимент 3. Проверка формулы разорения методом Монте-Карло	8
6.4	7.3. Дополнение: средняя длительность игры при $p = 1/2$	8
7	8. Непрерывное время: опциональные моменты	9
7.1	8.1. Дополнение: мартингалы непрерывного времени	10
8	9. Дополнение: почему «удвоение ставки» не опровергает теорему	10
9	10. Практические применения (дополнения)	10
10	12. Сводка ключевых формул	11

Главная идея

Мартингал — математическая модель *справедливой игры*: зная всю доступную информацию к моменту s , мы не можем предсказать систематическую прибыль или убыток к моменту $t > s$.

1 Определение мартингала

Пусть $X = (X_t)_{t \in T}$ — процесс, согласованный с $\mathbb{F} = (\mathcal{F}_t)_{t \in T}$, причём $\mathbb{E}|X_t| < \infty$ для каждого t .

- **Мартингал:** $\mathbb{E}(X_t | \mathcal{F}_s) = X_s$ при $s \leq t$.
- **Субмартингал:** $\mathbb{E}(X_t | \mathcal{F}_s) \geq X_s$.

- **Супермартингал:** $\mathbb{E}(X_t | \mathcal{F}_s) \leq X_s$.

Для дискретного времени достаточно проверить одношаговое условие

$$\mathbb{E}(X_{n+1} | \mathcal{F}_n) = X_n,$$

а затем применить свойство башни.

Следствие: для мартингала $\mathbb{E}X_t = \mathbb{E}X_0$; для субмартингала среднее не убывает, для супермартингала не возрастает.

NumPy / Matplotlib / SciPy готовы

1.1 2.1. Критерий для процессов с независимыми приращениями

Лемма (из конспекта). Если X имеет независимые приращения и $\mathbb{E}|X_t| < \infty$, то относительно естественной фильтрации

$$X \text{ — мартингал} \iff \mathbb{E}X_t = \text{const.}$$

Доказательство. При $s < t$ приращение $X_t - X_s$ независимо от $\mathcal{F}_s^X$, поэтому

$$\mathbb{E}(X_t | \mathcal{F}_s^X) = X_s + \mathbb{E}(X_t - X_s).$$

Правая часть равна X_s тогда и только тогда, когда $\mathbb{E}X_t = \mathbb{E}X_s$. $\square$

⚠ Важное уточнение

Независимость приращений принципиальна: вообще говоря, равенство $\mathbb{E}X_t = \text{const}$ не обеспечивает мартингальность.

1.2 2.2. Примеры


1. **Винеровский процесс** W_t : $\mathbb{E}(W_t | \mathcal{F}_s^W) = W_s$.
2. **Случайное блуждание:** $S_n = \sum_{k=1}^n \xi_k$ с независимыми интегрируемыми ξ_k — мартингал тогда и только тогда, когда $\mathbb{E}\xi_k = 0$ для каждого k .
3. **Пуассоновский процесс:** N_t интенсивности λ — субмартингал; $N_t - \lambda t$ — мартингал.
4. **Произведение:** $P_n = \prod_{k=1}^n \xi_k$, где независимые $\xi_k \geq 0$ и $\mathbb{E}\xi_k = 1$, — мартингал (если начальное произведение равно 1).
5. **Мартингал Леви:** $X_t = \mathbb{E}(\xi | \mathcal{F}_t)$ для $\xi \in L^1$ — мартингал по свойству башни.

i Дополнение: типичные мартингалы броуновского движения

$$W_t, \quad W_t^2 - t, \quad \exp\left(\theta W_t - \frac{\theta^2 t}{2}\right)$$

— мартингалы относительно естественной фильтрации винеровского процесса. Для второго используйте $W_t = W_s + (W_t - W_s)$, для третьего — моментопорождающую функцию нормального распределения.

1.3 Эксперимент 1. Справедливая игра, дрейф и пуассоновская компенсация



2 3. Выпуклые функции и субмартингалы


Утверждение (из конспекта). Если X — мартингал и $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ выпукла, причём $h(X_t)$ интегрируема, то $h(X_t)$ — субмартингал.

Доказательство (условное неравенство Йенсена):

$$\mathbb{E}[h(X_t) \mid \mathcal{F}_s] \geq h(\mathbb{E}[X_t \mid \mathcal{F}_s]) = h(X_s). \quad \square$$

Примеры (при соответствующей интегрируемости): $|X_t|$, X_t^2 , $e^{\theta X_t}$.

Дополнение. Если X — субмартингал, а h выпукла и неубывает, то $h(X)$ — субмартингал (при интегрируемости). Для произвольной выпуклой h без монотонности это неверно.



3 4. Разложение Дуба (дискретное время)

Процесс A_n называется **предсказуемым**, если A_n измерим относительно $\mathcal{F}_{n-1}$ при $n \geq 1$.

Теорема (из конспекта). Для любого интегрируемого адаптированного процесса X_n , $n \geq 0$, существует единственное представление

$$X_n = M_n + A_n, \quad A_0 = 0,$$

где M — мартингал, а A — предсказуемый процесс.

Формулы:

$$A_n = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[X_k - X_{k-1} \mid \mathcal{F}_{k-1}], \quad M_n = X_n - A_n.$$

Доказательство единственности. Если $X_n = M_n + A_n$, то

$$\mathbb{E}(X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}) = M_{n-1} + A_n = X_{n-1} - A_{n-1} + A_n.$$

Следовательно, $A_n - A_{n-1} = \mathbb{E}(\Delta X_n \mid \mathcal{F}_{n-1})$; при $A_0 = 0$ это однозначно определяет A , а значит, и M .

Доказательство существования. Зададим A приведенной формулой и положим $M = X - A$. Тогда

$$\mathbb{E}(M_n \mid \mathcal{F}_{n-1}) = \mathbb{E}(X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}) - A_n = X_{n-1} - A_{n-1} = M_{n-1}. \quad \square$$

Следствие: X — субмартингал тогда и только тогда, когда его предсказуемая часть A_n не убывает почти наверное.

3.1 4.1. Дополнение: пример с зависящим от прошлого дрейфом


Пусть ξ_n — независимые стандартные нормальные величины, $X_0 = 0$ и

$$X_n = X_{n-1} + 0.08 \tanh(X_{n-1}) + \xi_n.$$

Тогда

$$A_n = \sum_{k=1}^n 0.08 \tanh(X_{k-1}), \quad M_n = \sum_{k=1}^n \xi_k.$$

Таким образом, A собирает **предсказуемую часть** приращений, а M — **непредсказуемый шум**.



4 5. Марковские моменты и остановленные процессы

Случайное время $\tau \in \{0, 1, \dots\} \cup \{\infty\}$ — **марковский момент** (stopping time), если $\{\tau \leq n\} \in \mathcal{F}_n$ для всех n . В данном конспекте **моментом остановки** дополнительно называют конечный почти наверное марковский момент.

Остановленный процесс: $X_n^\tau = X_{n \wedge \tau}$.

i Дополнение: почему остановленный мартингал остаётся мартингалом?

При $n \geq 1$:

$$X_{n \wedge \tau} - X_{(n-1) \wedge \tau} = \mathbf{1}_{\{\tau \geq n\}}(X_n - X_{n-1}).$$

Индикатор $\{\tau \geq n\}$ измерим относительно $\mathcal{F}_{n-1}$, поэтому условное ожидание приращения равно нулю. Это утверждение для каждого фиксированного n **не означает автоматически** $\mathbb{E}X_\tau = \mathbb{E}X_0$ при неограниченном τ .

5 6. Теорема об остановке (дискретное время)

Теорема (из конспекта). Пусть X_n — интегрируемый адаптированный процесс. Тогда X является мартингалом (соответственно субмартингалом) тогда и только тогда, когда для любых **ограниченных** марковских моментов $\tau \leq \sigma$:

$$\mathbb{E}X_\tau = \mathbb{E}X_\sigma \quad (\text{соответственно } \leq).$$

Доказательство, направление $\Rightarrow$. Для мартингала

$$X_\sigma - X_\tau = \sum_{k=1}^m \mathbf{1}_{\{\tau < k \leq \sigma\}} (X_k - X_{k-1}),$$

где $\sigma \leq m$. Индикатор $\{\tau < k \leq \sigma\}$ является $\mathcal{F}_{k-1}$ -измеримым. Условное ожидание каждого слагаемого равно нулю; для субмартингала — неотрицательно.

Доказательство, направление $\Leftarrow$. Для $A \in \mathcal{F}_k$, $k < n$, положим $\tau_A = k$ на A и $\tau_A = n$ на A^c , а $\sigma = n$. Тогда

$$\mathbb{E}X_{\tau_A} \leq (=)\mathbb{E}X_n \implies \mathbb{E}[X_k \mathbf{1}_A] \leq (=)\mathbb{E}[X_n \mathbf{1}_A].$$

Это для всех $A \in \mathcal{F}_k$ эквивалентно $X_k \leq (=)\mathbb{E}(X_n | \mathcal{F}_k)$. $\square$

⚠ Нельзя забывать об ограниченности

Для симметричного случайного блуждания S_n моменты $\tau_1 = \inf\{n : S_n = 1\}$ и $\tau_2 = \inf\{n : S_n = 2\}$ конечны почти наверное, но не ограничены: $\mathbb{E}S_{\tau_1} = 1$ и $\mathbb{E}S_{\tau_2} = 2$. Нельзя применять теорему к ним без дополнительных условий.

5.1 6.1. Следствие из конспекта и полезные дополнения

Если $\tau < \infty$ почти наверное и $|X_{n \wedge \tau}| \leq C$ для всех n , то по ограниченной остановке и теореме Лебега

$$\mathbb{E}X_\tau = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}X_{n \wedge \tau} = \mathbb{E}X_0.$$

Дополнение. Вместо общей ограниченности можно требовать равномерную интегрируемость семейства $\{X_{n \wedge \tau} : n \geq 0\}$. Ещё одно достаточное условие: ограниченные приращения $|X_n - X_{n-1}| \leq C$ и $\mathbb{E}\tau < \infty$ (для мартингала).

Почему возникает ошибка? Почти наверное сходимость $X_{n \wedge \tau} \rightarrow X_\tau$ сама по себе не позволяет переставить предел и математическое ожидание.

5.2 Эксперимент 2. Неограниченная остановка: где ломается интуиция



Доля траекторий, достигших +1 к горизонту: 0.967

На достигших уровень траекториях конечное значение равно 1;

редкие, ещё не достигшие траектории компенсируют это отрицательными значениями.

6 7. Задача о разорении игрока

Игрок начинает с капитала x , $a < x < b$. На каждом шаге капитал увеличивается на 1 с вероятностью p и уменьшается на 1 с вероятностью $q = 1 - p$; $0 < p < 1$.

$$S_n = x + \sum_{k=1}^n \xi_k, \quad \mathbb{P}(\xi_k = 1) = p, \quad \mathbb{P}(\xi_k = -1) = q.$$

Время завершения: $\tau = \inf\{n \geq 0 : S_n \in \{a, b\}\}$. Это конечный почти наверное момент остановки. Действительно, в каждом блоке из $b - a$ шагов вероятность монотонно дойти до границы не меньше $p^{b-a} + q^{b-a} > 0$.

6.1 7.1. Честная игра: $p = q = 1/2$

S_n — мартингал; $S_{n \wedge \tau}$ ограничен, поэтому $\mathbb{E}S_\tau = x$. Поскольку $S_\tau \in \{a, b\}$,

$$x = a \mathbb{P}(S_\tau = a) + b \mathbb{P}(S_\tau = b).$$

Отсюда

$$\mathbb{P}(S_\tau = a) = \frac{b - x}{b - a}.$$

6.2 7.2. Нечестная игра: $p \neq q$

Введём $r = q/p$. Процесс r^{S_n} — мартингал, поскольку

$$\mathbb{E}(r^{\xi_k}) = pr + qr^{-1} = q + p = 1.$$

Применив теорему об остановке к ограниченному $r^{S_{n \wedge \tau}}$, получаем

$$r^x = r^a \mathbb{P}(S_\tau = a) + r^b \mathbb{P}(S_\tau = b).$$

Следовательно,


$$\mathbb{P}(S_\tau = a) = \frac{r^b - r^x}{r^b - r^a}, \quad r = \frac{q}{p}.$$

i Дополнение: вероятность выигрыша

$$\mathbb{P}(S_\tau = b) = \begin{cases} \frac{x - a}{b - a}, & p = 1/2, \\ \frac{r^x - r^a}{r^b - r^a}, & p \neq 1/2. \end{cases}$$

При $p \rightarrow 1/2$ формула для несимметричного случая непрерывно переходит в симметричную (например, по правилу Лопиталья).

6.3 Эксперимент 3. Проверка формулы разорения методом Монте-Карло



6.4 7.3. Дополнение: средняя длительность игры при $p = 1/2$


Процесс $S_n^2 - n$ — мартингал. При ограниченном капитале до остановки и конечном $\mathbb{E}\tau$ применяем остановку и предельный переход:

$$\mathbb{E}\tau = \mathbb{E}(S_\tau^2) - x^2.$$

Подставляя вероятности достижения границ,

$$\mathbb{E}\tau = (x - a)(b - x).$$

Почему $\mathbb{E}\tau < \infty$? Вероятность не закончить игру за каждый блок из $b - a$ шагов ограничена сверху числом $1 - p^{b-a} - q^{b-a} < 1$; значит, хвост τ убывает геометрически по блокам.



7 8. Непрерывное время: опциональные моменты

Определение (из конспекта). Случайное время $\tau : \Omega \rightarrow [0, \infty]$ называется **опциональным моментом**, если

$$\{\tau < t\} \in \mathcal{F}_t \quad \text{для всех } t \geq 0.$$

Пример из конспекта: для процесса X с непрерывными справа траекториями и открытого $G \subseteq \mathbb{R}$ время $\tau = \inf\{t : X_t \in G\}$ является опциональным моментом относительно естественной фильтрации.

Теорема (из конспекта, без доказательства). Если X — мартингал с непрерывными справа траекториями, а $\tau \leq \sigma$ — ограниченные опциональные моменты, то

$$\mathbb{E}X_\tau = \mathbb{E}X_\sigma.$$

⚠ Терминологическое уточнение

В литературе чаще используют условие $\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t$ для *stopping time*. В конспекте условие $\tau < t$ называется «опциональным моментом». При правой непрерывности фильтрации эти условия эквивалентны; без дополнительных условий различие важно.

7.1 8.1. Дополнение: мартингалы непрерывного времени

Для броуновского движения W_t :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(W_t | \mathcal{F}_s) &= W_s, \\ \mathbb{E}(W_t^2 - t | \mathcal{F}_s) &= W_s^2 - s, \\ \mathbb{E}[e^{\theta W_t - \theta^2 t/2} | \mathcal{F}_s] &= e^{\theta W_s - \theta^2 s/2}.\end{aligned}$$

Интерпретация: W_t^2 растёт в среднем со скоростью 1, и вычитание t компенсирует этот предсказуемый рост.



8 9. Дополнение: почему «удвоение ставки» не опровергает теорему

Представим честные независимые броски монеты: проиграв, игрок удваивает ставку, пока не выиграет. Формально выигрыш $+1$ достигается почти наверное, но для применения теоремы об остановке к *неограниченному* времени нужны дополнительные условия. Ставки и потенциальные потери неограниченны; равномерная интегрируемость отсутствует.

Вывод: «мартингал» не означает «невозможно выиграть почти наверное», а означает отсутствие положительного условного ожидаемого приращения при фиксированном времени. Условия остановки нельзя опускать.

9 10. Практические применения (дополнения)

i Финансы: справедливая цена и отсутствие арбитража

В идеализированных моделях без арбитража **дисконтированная** цена актива является мартингалом *при риск-нейтральной мере*, а не обязательно при реальной вероятностной мере. В биномиальной модели это позволяет оценивать производные инструменты обратной индукцией условных ожиданий.

i Машинное обучение: последовательное прогнозирование

Разность между наблюдением и его условным прогнозом $D_n = Y_n - \mathbb{E}(Y_n \mid \mathcal{F}_{n-1})$ образует последовательность мартингальных разностей: $\mathbb{E}(D_n \mid \mathcal{F}_{n-1}) = 0$. Это полезно в онлайн-обучении и анализе адаптивно собранных данных.

i Статистика: последовательное тестирование

Неотрицательные тестовые мартингалы и супер-мартингалы позволяют контролировать вероятность ложной тревоги при многократном просмотре данных. Например, неравенство Вилля: если $M_0 = 1$ и $M_n \geq 0$ — супермартингал, то $\mathbb{P}(\sup_n M_n \geq 1/\alpha) \leq \alpha$.

i Биология и физика

Симметричное случайное блуждание — простая модель диффузии, а компенсированный пуассоновский процесс отделяет случайные флуктуации от средней интенсивности событий (например, импульсов детектора).

10 12. Сводка ключевых формул

Объект	Формула
Мартингал	$\mathbb{E}(X_t \mid \mathcal{F}_s) = X_s$
Субмартингал	$\mathbb{E}(X_t \mid \mathcal{F}_s) \geq X_s$
Разложение Дуба	$X_n = M_n + A_n$
Предсказуемая часть	$A_n = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(\Delta X_k \mid \mathcal{F}_{k-1})$
Ограниченная остановка	$\mathbb{E}X_\tau = \mathbb{E}X_\sigma$ при $\tau \leq \sigma$
Разорение, $p = 1/2$	$\mathbb{P}(S_\tau = a) = (b - x)/(b - a)$
Разорение, $p \neq 1/2$	$\mathbb{P}(S_\tau = a) = (r^b - r^x)/(r^b - r^a), r = q/p$
Средняя длительность, $p = 1/2$	$\mathbb{E}\tau = (x - a)(b - x)$

Что нужно уметь: проверять условное ожидание, распознавать предсказуемую компенсацию, выбирать подходящий мартингал и проверять условия теоремы об остановке.